

# Instrucciones Posteriores al Tratamiento de Conducto Radicular

La terapia conducto puede requerir de 1 a 2 citas para completarse. Después de cada cita en la que se haya utilizado anestesia, sus labios, dientes y lengua pueden estar entumecidos durante varias horas. Evite masticar el lado del diente tratado hasta que el entumecimiento haya desaparecido por completo.

Su dentista coloca un empaste temporal o una corona para proteger el diente entre citas.

Entre citas, es común (y no es un problema) que una pequeña porción de su empaste o corona temporal se desgaste o se rompa. Si se cae todo el empaste o si se desprende una corona temporal, llame a nuestra oficina para que la reemplacen.

Para proteger el diente y ayudar a mantener el temporal en su lugar:  
Evite masticar alimentos pegajosos (especialmente chicle)  
Evite morder alimentos duros y sustancias duras, como hielo, uñas y lápices.  
Si es posible, mastique solo del lado opuesto de la boca.

Es normal sentir algunas molestias durante varios días después de una cita de tratamiento de conducto, especialmente al masticar. No es raro que un diente sienta molestias o incluso presente un dolor sordo inmediatamente después de recibir un tratamiento de conducto. Esto debería desaparecer en unos pocos días (o incluso semanas). Incluso si no sentía ninguna molestia antes del tratamiento, es normal que sienta algún grado de molestia durante unos días después. La sensibilidad es normal y no es motivo de alarma.

Para controlar las molestias, tome los analgésicos recomendados por su dentista. Si le recetan antibióticos, continúe tomándolos durante el tiempo indicado, incluso si todos los síntomas y signos de infección han desaparecido.

Si no le recetamos ningún analgésico pero siente dolor después de su cita, le recomendamos que tome analgésicos de venta libre. Recomendamos ibuprofeno (Motrin, Advil, Nuprin) o naproxeno (Aleve). Si experimenta molestias que no se pueden controlar con analgésicos o si se desarrolla hinchazón, llame a nuestra oficina.

Para reducir aún más el dolor y la hinchazón, enjuáguese tres veces al día con agua tibia con sal; disuelva una cucharadita de sal en una taza de agua tibia, luego enjuague, agite y escupa. Es importante seguir cepillándose los dientes y usando hilo dental con normalidad.

Por lo general, el último paso después del tratamiento de conducto es la colocación de una corona en el diente. Una corona cubre y protege el diente para que no se rompa en el futuro. A menos que de otro modo

Segun lo indicado por el dentist, es fundamental que le coloquen una corona en el diente tratado con tratamiento de conducto lo antes posible.

El retraso en la obtencion de la restauracion final (corona) puede provocar una fractura y/o posible perdida del diente.

Si su mordida se siente desigual, tiene dolor persistente o tiene alguna otra pregunta o inquietude, llame a nuestro consultorio dental.